

★乳癌(Triple negative) テセントリク+nabPTX療法

	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
				休業日	最終日
注射	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚生食注 100mL … 1瓶 本体1本目 最後フラッシュして下さい。 1回	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚生食注 100mL … 1瓶 本体1本目 最後フラッシュして下さい。 1回	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚生食注 100mL … 1瓶 本体1本目 最後フラッシュして下さい。 1回		
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 【6.6mg】テカトロン注射液 … 1瓶 グラニセロン点滴静注バッグ3mg … 1袋 所要時間:0時間30分 本体2本目 1回	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 【6.6mg】テカトロン注射液 … 1瓶 グラニセロン点滴静注バッグ3mg … 1袋 所要時間:0時間30分 本体2本目 1回	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 【6.6mg】テカトロン注射液 … 1瓶 グラニセロン点滴静注バッグ3mg … 1袋 所要時間:0時間30分 本体2本目 1回		
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 テセントリク点滴静注840mg 14mL … 1瓶 大塚生食注 250mL … 1袋 所要時間:1時間0分 初回投与問題なければ2回目以降は30分 で投与 本体3本目 1回	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 アブラキサン注【規格分解用】 … 0.1mg 大塚生食注 100mL … 1瓶 所要時間:0時間30分 1V当り20mLで溶解して下さい。残った生 食をすべて抜いてから懸濁したアブラキサン 注を必要量入れて下さい。 本体3本目 1回	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 テセントリク点滴静注840mg 14mL … 1瓶 大塚生食注 250mL … 1袋 所要時間:1時間0分 初回投与問題なければ2回目以降は30分 で投与 本体3本目 1回		
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 アブラキサン注【規格分解用】 … 0.1mg 大塚生食注 100mL … 1瓶 所要時間:0時間30分 1V当り20mLで溶解して下さい。残った生 食をすべて抜いてから懸濁したアブラキサン 注を必要量入れて下さい。 本体4本目 1回			点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 アブラキサン注【規格分解用】 … 0.1mg 大塚生食注 100mL … 1瓶 所要時間:0時間30分 1V当り20mLで溶解して下さい。残った生 食をすべて抜いてから懸濁したアブラキサン 注を必要量入れて下さい。 本体4本目 1回	
投薬					
検査					