

■大腸癌 FOLFIRI+BV療法(インフューザーポンプ使用)

| | | 休業最終日 |
|------|---|-------|
| | Day1 | Day14 |
| 注射 | 点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン クラニセトロン静注液3mgパック「NK」 … 1袋 テカトロン注射液6.6mg … 1瓶 所要時間:0時間30分 1回 | |
| | 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 アバスチン注【規格分解用】 … 0.01mg 大塚生食注 100mL … 1瓶 所要時間:1時間30分 初回当時間題なければ2回目以降は60分 で投与 3回目以降は30分での投与も可 1回 | |
| | 点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン レホホリナート注【規格分解用】 … 0.1mg テルモ糖注5% 250mL … 1袋 所要時間:2時間0分 トホテン注と同時に投与 1回 | |
| | 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 トホテン注[CPT-11]【規格分解用 … 0.01mg テルモ糖注5% 250mL … 1袋 所要時間:2時間0分 遮光してください。 レホホリナートと同時に投与 1回 | |
| | 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 5-FU注【規格分解用】 … 0.01mg 大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 1回 | |
| | 点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 5-FU注【規格分解用】 … 0.01mg 生理食塩液【規格分解用】 … 0.01mL 所要時間:46時間0分 インフューザーポンプを用いて 1回 | |
| 看護 | | |
| 看護項目 | | |
| 検査 | | |