

■大腸癌 FOLFIRI+CET療法【2クール目以降】

	Day1	Day8	休薬最終日 Day14
注射	点滴(D.I.V.)… 1 末梢メイン 大塚生食注 100mL… 1瓶 フロキシドール0.75mg 5mL… 1瓶 テカドロン注射液6.6mg… 1瓶 ホウサン注5mg… 1管 所要時間:0時間30分 1本目 1回	点滴(D.I.V.)… 1 末梢メイン 大塚生食注 100mL… 1瓶 テカドロン注射液6.6mg… 1瓶 ホウサン注5mg… 1管 所要時間:0時間30分 1本目 1回	
	点滴(D.I.V.)… 1 末梢メイン 大塚生食注 50mL… 1瓶 所要時間:0時間15分 2本目 アービタックス前フラッシュ用 1回	点滴(D.I.V.)… 1 末梢メイン 大塚生食注 50mL… 1瓶 所要時間:0時間15分 2本目 アービタックス前フラッシュ用 1回	
	点滴(D.I.V.)… 1 末梢メイン アービタックス注【規格分解用】 … 0.1mg 大塚生食注 250mL… 1袋 所要時間:1時間0分 2回目以降用 250mg/m2 3本目 1回	点滴(D.I.V.)… 1 末梢メイン アービタックス注【規格分解用】 … 0.1mg 大塚生食注 250mL… 1袋 所要時間:1時間0分 2回目以降用 250mg/m2 3本目 1回	
	点滴(D.I.V.)… 1 末梢メイン 大塚生食注 50mL… 1瓶 所要時間:0時間15分 4本目 アービタックス後フラッシュ用 1回	点滴(D.I.V.)… 1 末梢メイン 大塚生食注 50mL… 1瓶 所要時間:0時間15分 4本目 アービタックス後フラッシュ用 1回	
	点滴(D.I.V.)… 1 末梢メイン トネチン注[CPT-11]【規格分解用… 0.1mg フルモ糖注5% 250mL… 1袋 所要時間:2時間0分 レボホリナートと同時に投与 5本目 遮光して下さい。 1回		
	点滴(D.I.V.)… 1 末梢側管 レボホリナート注【規格分解用】… 0.1mg フルモ糖注5% 250mL… 1袋 所要時間:2時間0分 トネチンと同時に投与 6本目 1回		
	点滴(D.I.V.)… 1 末梢メイン 5-FU注【規格分解用】… 0.1mg 大塚生食注 50mL… 1瓶 所要時間:0時間15分 7本目 全開で投与 1回		
	点滴(D.I.V.)… 1 末梢メイン 5-FU注【規格分解用】… 0.1mg 生理食塩液【規格分解用】… 0.1mL 所要時間:46時間0分 8本目 ポートより投与 インフューザーポンプを用いて 1回		
看護			
看護項目			
検査			