

★大腸癌 FOLFOXIRI+BV療法

		休業最終日
	Day1	Day14
注射	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン アロキン静注0.75mg 5mL … 1瓶 【6.6mg】テガドロン注射液 … 1瓶 大塚生食注 100mL … 1瓶 所要時間:0時間30分 本体1本目 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 アバスタ注【規格分解用】 … 0.1mg 大塚生食注 100mL … 1瓶 所要時間:1時間30分 初回当時間題なければ2回目以降は60分 で投与 3回目以降は30分での投与も可 本体2本目 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 トボテン注[CPT-11]【規格分解用 … 0.1mg テルモフトウ糖注5% 250mL … 1袋 所要時間:1時間0分 遮光して下さい。 本体3本目 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン レボネリナト注【規格分解用】 … 0.1mg テルモフトウ糖注5% 250mL … 1袋 所要時間:2時間0分 エルフラットと同時に投与 本体4本目 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 エルフラット注【規格分解用】 … 0.1mg テルモフトウ糖注5% 250mL … 1袋 所要時間:2時間0分 レボネリナトと同時に投与 本体5本目 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 5-FU注【規格分解用】 … 0.1mg 生理食塩液【規格分解用】 … 0.1mL 所要時間:46時間0分 ポートより投与 インフューザーポンプを用いて 46時間かけて持続投与 本体6本目 1回	
看護		
看護項目		
検査		