

◆大腸癌 mFOLFOX6+BV療法

			休業最終日	
		Day1	Day3	Day14
注射	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン グラネセトロン静注液3mgバッグ「NK」 … 1袋 デキストロン注射液6.6mg … 1瓶 所要時間:0時間30分 本体1本目 1回			
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 アハステン注【規格分解用】 … 0.1mg 大塚生食注 100mL … 1瓶 所要時間:1時間30分 初回当時間題なければ2回目を以降は60分 で投与 3回目を以降は30分での投与も可 本体2本目 1回			
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン レボホリナート注【規格分解用】 … 0.1mg テルモ糖注5% 250mL … 1袋 所要時間:2時間0分 エルフラットと同時に投与 本体3本目 1回			
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 エルフラット注【規格分解用】 … 0.1mg テルモ糖注5% 250mL … 1袋 所要時間:2時間0分 レボホリナートと同時に投与 本体4本目 1回			
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 5-FU注【規格分解用】 … 0.1mg 大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 全開で投与 本体5本目 1回			
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 5-FU注【規格分解用】 … 0.1mg 生理食塩液【規格分解用】 … 0.1mL 所要時間:46時間0分 ポートより投与 インフューザーポンプを用いて 46時間かけて持続投与 本体6本目 1回			
看護				
看護項目				
検査				