

★大腸癌 mFOLFOX6+Pmab療法

	Day1	休業最終日 Day14
注射	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン グラニセロン点滴静注バッグ3mg … 1袋 テカロン注射液6.6mg … 1瓶 所要時間:0時間30分 本体1本目 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間5分 フラッシュ用 ヘクティックス投与前 本体2本目 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 100mL … 1瓶 ヘクティックス注【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:1時間0分 専用フィルターを使用して下さい。 本体3本目 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間5分 フラッシュ用 ヘクティックス投与後 本体4本目 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ糖注5% 250mL … 1袋 シホネリナド注【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:2時間0分 エルフラットと同時に投与 本体5本目 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 テルモ糖注5% 250mL … 1袋 エルフラット注【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:2時間0分 シホネリナドと同時に投与 本体6本目 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚生食注 50mL … 1瓶 5-FU注【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:0時間15分 全額で投与 本体7本目 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 生理食塩液【規格分解用】 … 0.1mL 5-FU注【規格分解用】 … 0.1mg ポートより投与 インフューザーポンプを用いて 46時間かけて持続投与 本体8本目 1回	
看護		
看護項目		
検査		