★多発性骨髄腫　KRd療法【1クール目】

	Day1	Day2	Day8	Day9	Day15	Day16	Day22	Day28
								最終日
注射	点滴(D.I.V.) … 1 【6.6mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液 … 5瓶 大塚生食注　100mL … 1瓶 所要時間：0時間30分 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 ｶｲﾌﾞﾛﾘｽ注【規格分解用】… 0.1mg 大塚蒸留水【規格分解用】… 0.1mL ★大塚糖液5%　50mL … 1瓶 所要時間：0時間10分 10mg当り5mLの注射用水で溶解して下さい。 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注　20mL … 1管 ﾌﾗｯｼｭ用 1回	点滴(D.I.V.) … 1 ★大塚生食注　50mL … 1瓶 所要時間：0時間15分 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 ｶｲﾌﾞﾛﾘｽ注【規格分解用】… 0.1mg 大塚蒸留水【規格分解用】… 0.1mL ★大塚糖液5%　50mL … 1瓶 所要時間：0時間10分 10mg当り5mLの注射用水で溶解して下さい。 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注　20mL … 1管 ﾌﾗｯｼｭ用 1回	点滴(D.I.V.) … 1 【6.6mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液 … 5瓶 大塚生食注　100mL … 1瓶 所要時間：0時間30分 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 ｶｲﾌﾞﾛﾘｽ注【規格分解用】… 0.1mg 大塚蒸留水【規格分解用】… 0.1mL ★大塚糖液5%　50mL … 1瓶 所要時間：0時間10分 10mg当り5mLの注射用水で溶解して下さい。 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注　20mL … 1管 ﾌﾗｯｼｭ用 1回	点滴(D.I.V.) … 1 ★大塚生食注　50mL … 1瓶 所要時間：0時間15分 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 ｶｲﾌﾞﾛﾘｽ注【規格分解用】… 0.1mg 大塚蒸留水【規格分解用】… 0.1mL ★大塚糖液5%　50mL … 1瓶 所要時間：0時間10分 10mg当り5mLの注射用水で溶解して下さい。 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注　20mL … 1管 ﾌﾗｯｼｭ用 1回	点滴(D.I.V.) … 1 【6.6mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液 … 5瓶 大塚生食注　100mL … 1瓶 所要時間：0時間30分 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 ｶｲﾌﾞﾛﾘｽ注【規格分解用】… 0.1mg 大塚蒸留水【規格分解用】… 0.1mL ★大塚糖液5%　50mL … 1瓶 所要時間：0時間10分 10mg当り5mLの注射用水で溶解して下さい。 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注　20mL … 1管 ﾌﾗｯｼｭ用 1回	点滴(D.I.V.) … 1 ★大塚生食注　50mL … 1瓶 所要時間：0時間15分 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 ｶｲﾌﾞﾛﾘｽ注【規格分解用】… 0.1mg 大塚蒸留水【規格分解用】… 0.1mL ★大塚糖液5%　50mL … 1瓶 所要時間：0時間10分 10mg当り5mLの注射用水で溶解して下さい。 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注　20mL … 1管 ﾌﾗｯｼｭ用 1回	点滴(D.I.V.) … 1 【6.6mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液 … 5瓶 大塚生食注　100mL … 1瓶 所要時間：0時間30分 1回	
投薬								
検査								