

★多発性骨髄腫 Kd療法【1クール目】 ※週1回投与

	Day1	Day8	Day15	Day28
				休薬最終日
注射	<p>点滴(D.I.V.) … 1 【6.6mg】テ`カト`ロン注射液 … 6瓶 大塚生食注 100mL … 1瓶 所要時間:0時間30分 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 カイクロリス注【規格分解用】 … 0.1mg 大塚蒸留水【規格分解用】 … 0.1mL 大塚糖液5% 100mL … 1瓶 所要時間:0時間30分 10mg当り5mLの注射用水で溶解して下さい。 全量100mLにして下さい。 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 20mL … 1管 フラッシュ用 1回</p>	<p>点滴(D.I.V.) … 1 【6.6mg】テ`カト`ロン注射液 … 6瓶 大塚生食注 100mL … 1瓶 所要時間:0時間30分 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 カイクロリス注【規格分解用】 … 0.1mg 大塚蒸留水【規格分解用】 … 0.1mL 大塚糖液5% 100mL … 1瓶 所要時間:0時間30分 10mg当り5mLの注射用水で溶解して下さい。 全量100mLにして下さい。 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 20mL … 1管 フラッシュ用 1回</p>	<p>点滴(D.I.V.) … 1 【6.6mg】テ`カト`ロン注射液 … 6瓶 大塚生食注 100mL … 1瓶 所要時間:0時間30分 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 カイクロリス注【規格分解用】 … 0.1mg 大塚蒸留水【規格分解用】 … 0.1mL 大塚糖液5% 100mL … 1瓶 所要時間:0時間30分 10mg当り5mLの注射用水で溶解して下さい。 全量100mLにして下さい。 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 20mL … 1管 フラッシュ用 1回</p>	
投薬				
検査				