★Hyper-CVAD(A)療法

	Day1	Day2	Day3	Day4	Day11	Day12	Day13	Day14
注射	点滴(D.I.V.) … 1 ﾃﾙﾓ生食　500mL … 1袋 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ注[CPA]【規格分解用】… 0.1mg 所要時間:3時間0分 1回目 1V当り25mlで溶解して下さい。 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 ﾃﾙﾓ生食　500mL … 1袋 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ注[CPA]【規格分解用】… 0.1mg 所要時間:3時間0分 2回目 1V当り25mlで溶解して下さい。 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注　100mL … 1瓶 【6.6mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液 … 5瓶 所要時間:0時間30分 1回	点滴(D.I.V.) … 1 ﾃﾙﾓ生食　500mL … 1袋 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ注[CPA]【規格分解用】… 0.1mg 所要時間:3時間0分 1回目 1V当り25mlで溶解して下さい。 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 ﾃﾙﾓ生食　500mL … 1袋 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ注[CPA]【規格分解用】… 0.1mg 所要時間:3時間0分 2回目 1V当り25mlで溶解して下さい。 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注　100mL … 1瓶 【6.6mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液 … 5瓶 所要時間:0時間30分 1回	点滴(D.I.V.) … 1 ﾃﾙﾓ生食　500mL … 1袋 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ注[CPA]【規格分解用】… 0.1mg 所要時間:3時間0分 1回目 1V当り25mlで溶解して下さい。 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 ﾃﾙﾓ生食　500mL … 1袋 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ注[CPA]【規格分解用】… 0.1mg 所要時間:3時間0分 2回目 1V当り25mlで溶解して下さい。 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注　100mL … 1瓶 【6.6mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液 … 5瓶 所要時間:0時間30分 1回	点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注2ﾎﾞｰﾄ100mL … 1ｷｯﾄ ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ注【規格分解用】… 0.1mg 所要時間:0時間30分 10mg当り3mlで溶解して下さい。 1回 ---------- 静脈内注射(I.V.) … 1 生理食塩液【規格分解用】… 0.1mL ｵﾝｺﾋﾞﾝ注[VCR]【規格分解用】 … 0.1mg 1V当り10mlで溶解して下さい。 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注　100mL … 1瓶 【6.6mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液 … 5瓶 所要時間:0時間30分 1回	静脈内注射(I.V.) … 1 生理食塩液【規格分解用】… 0.1mL ｵﾝｺﾋﾞﾝ注[VCR]【規格分解用】 … 0.1mg 1V当り10mlで溶解して下さい。 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注　100mL … 1瓶 【6.6mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液 … 5瓶 所要時間:0時間30分 1回	点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注　100mL … 1瓶 【6.6mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液 … 5瓶 所要時間:0時間30分 1回	点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注　100mL … 1瓶 【6.6mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液 … 5瓶 所要時間:0時間30分 1回	点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注　100mL … 1瓶 【6.6mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液 … 5瓶 所要時間:0時間30分 1回
検査								