

◆胃癌 5-FU+MTX療法

		休薬最終日
	Day1	Day7
注射	<p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚生食注 1L … 1袋 炭酸水素ナトリウム注(メイロン) 20mL … 2管 所要時間: 4時間0分 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 グラニセロン静注液3mgハック「NK」 … 1袋 プリンペラン注射液10mg … 1管 注射用ソル・ムコート125 … 2瓶 所要時間: 0時間15分 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 100mL … 1瓶 メトトレキサート注[MTX]【規格分解用 … 0.01mg 開始時間: 0時15分 50mg/Vを10mlで溶解して下さい。 1回</p> <p>-----</p> <p>静脈内注射(I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 20mL … 1管 ジアモックス注射用500mg … 1瓶 1回</p> <p>-----</p> <p>静脈内注射(I.V.) … 1 末梢側管 5-FU注【規格分解用】 … 0.01mg メトトレキサート投与2時間後 1回</p>	
内服		
注意事項		
看護		
看護項目		
服薬指導		
文書管理		
検査		