

■大腸癌 FOLFIRI療法(インフューザーポンプ使用)

	Day1	休薬最終日 Day14
注射	<p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚生食注 100mL … 1瓶 アロキシ静注0.75mg 5mL … 1瓶 デカロン注射液6.6mg … 1瓶 所要時間:0時間30分 1本目 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン トホテン注[CPT-11]【規格分解用 … 0.1mg テルモ糖注5% 250mL … 1袋 所要時間:2時間0分 2本目 レボホリナートと同時に投与 遮光して下さい。 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 レボホリナート注【規格分解用】 … 0.1mg テルモ糖注5% 250mL … 1袋 所要時間:2時間0分 3本目 トホテン注と同時に投与 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 5-FU注【規格分解用】 … 0.1mg 大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 4本目 全開で投与 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 5-FU注【規格分解用】 … 0.1mg 生理食塩液【規格分解用】 … 0.1mL 所要時間:46時間0分 5本目 ポートより投与 インフューザーポンプを用いて 1回</p>	
検査		