

■大腸癌 FOLFIRI+CET療法【1クール目】

|      | Day1   | Day8  | 休業最終日 |
|------|--|---|-------|
|      | 点滴(D.I.V.) … 1<br>末梢メイン<br>大塚生食注 100mL … 1瓶<br>アドロン注0.75mg 5mL … 1瓶<br>テカドロン注射液6.6mg … 1瓶<br>ホケミン注5mg … 1管<br>所要時間:0時間30分<br>1本目<br>1回               | 点滴(D.I.V.) … 1<br>末梢メイン<br>大塚生食注 100mL … 1瓶<br>テカドロン注射液6.6mg … 1瓶<br>ホケミン注5mg … 1管<br>所要時間:0時間30分<br>1本目<br>1回                      |       |
|      | 点滴(D.I.V.) … 1<br>末梢メイン<br>大塚生食注 50mL … 1瓶<br>所要時間:0時間15分<br>2本目<br>アービタックス前フラッシュ用<br>1回   | 点滴(D.I.V.) … 1<br>末梢メイン<br>大塚生食注 50mL … 1瓶<br>所要時間:0時間15分<br>2本目<br>アービタックス前フラッシュ用<br>1回  |       |
|      | 点滴(D.I.V.) … 1<br>末梢メイン<br>アービタックス注【規格分解用】<br>… 1mg<br>テルモ生食 500mL … 1袋<br>所要時間:2時間0分<br>初回用 400mg/m <sup>2</sup><br>初回は120分 投与後60分経過観察<br>3本目<br>1回 | 点滴(D.I.V.) … 1<br>末梢側管<br>アービタックス注【規格分解用】<br>… 0.1mg<br>大塚生食注 250mL … 1袋<br>所要時間:1時間0分<br>2回目を以降用 250mg/m <sup>2</sup><br>3本目<br>1回 |       |
|      | 点滴(D.I.V.) … 1<br>末梢メイン<br>大塚生食注 100mL … 1瓶<br>所要時間:0時間15分<br>4本目<br>アービタックス後フラッシュ用<br>1回  | 点滴(D.I.V.) … 1<br>末梢メイン<br>大塚生食注 50mL … 1瓶<br>所要時間:0時間15分<br>4本目<br>アービタックス後フラッシュ用<br>1回  |       |
| 注射   | 点滴(D.I.V.) … 1<br>末梢メイン<br>トホテシン注[CPT-11]【規格分解用 …<br>0.1mg<br>テルモ糖注5% 250mL … 1袋<br>所要時間:2時間0分<br>レボネリナトと同時に投与<br>5本目<br>避光して下さい。<br>1回              |   |       |
|      | 点滴(D.I.V.) … 1<br>末梢側管<br>レボネリナト注【規格分解用】 … 0.1mg<br>テルモ糖注5% 250mL … 1袋<br>所要時間:2時間0分<br>トホテシンと同時に投与<br>6本目<br>1回                                     |   |       |
|      | 点滴(D.I.V.) … 1<br>末梢メイン<br>5-FU注【規格分解用】 … 0.1mg<br>大塚生食注 50mL … 1瓶<br>所要時間:0時間15分<br>7本目<br>全開で投与<br>1回  |   |       |
|      | 点滴(D.I.V.) … 1<br>末梢メイン<br>5-FU注【規格分解用】 … 0.1mg<br>生理食塩液【規格分解用】 … 0.1mL<br>所要時間:46時間0分<br>8本目<br>ポートより投与<br>インフューザーポンプを用いて<br>1回                     |   |       |
| 看護   |  |   |       |
| 看護項目 |  |   |       |
| 検査   |  |   |       |