

★大腸癌 FOLFIRI+Pmab療法(インフルエンザ不使用)

	Day1	Day2	休業最終日
			Day14
注射	<p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン グラネセロン静注液3mgハッグ「NK」 … 1袋 チカドロン注射液6.6mg … 1瓶 所要時間:0時間30分 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間5分 フラッシュ用 ヘクティックス投与前 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 ヘクティックス注【規格分解用】 … 0.01mg 大塚生食注 100mL … 1瓶 所要時間:1時間0分 専用フィルターを使用して下さい。 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間5分 フラッシュ用 ヘクティックス投与後 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン レボネリナート注【規格分解用】 … 0.1mg テルモ糖注5% 250mL … 1袋 所要時間:2時間0分 トホシテン注と同時に投与 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 トホシテン注【CPT-11】【規格分解用】 … 0.01mg テルモ糖注5% 250mL … 1袋 所要時間:2時間0分 遮光してください。 レボネリナートと同時に投与 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 5-FU注【規格分解用】 … 0.01mg 大塚糖液5% 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 5-FU注【規格分解用】 … 0.01mg テルモ糖注5% 500mL … 1袋 所要時間:23時間0分 1回</p>	<p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ糖注5% 500mL … 1袋 5-FU注【規格分解用】 … 0.01mg 所要時間:23時間0分 1回</p>	
看護			
看護項目			
検査			