

★大腸癌 FOLFIRI+Ramucirumab(サイラムザ)

	Day1	Day14
		最終日
注射	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ★大塚生食注 50mL … 1瓶 アロキシ静注0.75mg 5mL … 1瓶 【6.6mg】テクトロン注射液 … 1瓶 ホララン注5mg … 1管 所要時間:0時間30分 1本目 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 サイラムザ注【規格分解用】 … 0.1mg 大塚生食注 250mL … 1袋 所要時間:1時間0分 2本目 蛋白質透過型のフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を使用 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 ★大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 3本目 フラッシュ用 サイラムザ投与後 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン トボテン注【OPT-11】【規格分解用】 … 0.1mg テルモブドウ糖注5% 250mL … 1袋 所要時間:2時間0分 4本目 レボネリナトと同時に投与 遮光して下さい。 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 レボネリナト注【規格分解用】 … 0.1mg テルモブドウ糖注5% 250mL … 1袋 所要時間:2時間0分 5本目 トボテン注と同時に投与 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 5-FU注【規格分解用】 … 0.1mg ★大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 6本目 全開で投与 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 5-FU注【規格分解用】 … 0.1mg 生理食塩液【規格分解用】 … 0.1mL 所要時間:46時間0分 7本目 ボートより投与 インフューザーポンプを用いて 1回	
検査		