

★大腸癌 FOLFIRI療法(インフェーサーポンプ不使用)

			休業最終日
	Day1	Day2	Day14
注射	<p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン グラニセロン静注液3mgﾊﾞｯｸﾞ「NK」 … 1袋 テカロン注射液6.6mg … 1瓶 所要時間:0時間30分 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン レボホリナート注【規格分解用】 … 0.1mg テルモ糖注5% 250mL … 1袋 所要時間:2時間0分 トキシテン注と同時に投与 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 トキシテン注[CPT-11]【規格分解用 … 0.01mg テルモ糖注5% 250mL … 1袋 所要時間:2時間0分 遮光してください。 レボホリナートと同時に投与 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 5-FU注【規格分解用】 … 0.01mg 大塚糖液5% 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 5-FU注【規格分解用】 … 0.01mg テルモ糖注5% 500mL … 1袋 所要時間:23時間0分 1回</p>	<p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ糖注5% 500mL … 1袋 5-FU注【規格分解用】 … 0.01mg 所要時間:23時間0分 1回</p>	
看護			
看護項目			
検査			