

★大腸癌 FOLFOX4+Pmab療法

	Day1	Day2
注射	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン グラネセロン静注液3mgバック「NK」 … 1袋 テカトロン注射液6.6mg … 1瓶 所要時間:0時間30分 1回	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ糖注5% 250mL … 1袋 レボホリナート注【規格分解用】 … 0.01mg 所要時間:2時間0分 1回
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間5分 フラッシュ用 ヘクティビックス投与前 1回	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚糖液5% 50mL … 1瓶 5-FU注【規格分解用】 … 0.01mg 所要時間:0時間15分 1回
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 100mL … 1瓶 ヘクティビックス注【規格分解用】 … 0.01mg 所要時間:1時間0分 専用フィルターを使用して下さい。 1回	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ糖注5% 500mL … 1袋 5-FU注【規格分解用】 … 0.01mg 所要時間:22時間0分 1回
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間5分 フラッシュ用 ヘクティビックス投与後 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ糖注5% 250mL … 1袋 レボホリナート注【規格分解用】 … 0.01mg 所要時間:2時間0分 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 テルモ糖注5% 250mL … 1袋 エルブラット注【規格分解用】 … 0.01mg 所要時間:2時間0分 レボホリナートと同時に 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚糖液5% 50mL … 1瓶 5-FU注【規格分解用】 … 0.01mg 所要時間:0時間15分 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ糖注5% 500mL … 1袋 5-FU注【規格分解用】 … 0.01mg 所要時間:22時間0分 1回	
検査		