

■大腸癌 mFOLFOX6+CET療法【2クール目以降】

	Day1	Day8	休薬最終日
	Day1	Day8	Day14
注射	点滴(D.I.V.)…1 末梢メイン 大塚生食注 100mL…1瓶 アロキシ静注0.75mg 5mL…1瓶 テカドロン注射液6.6mg…1瓶 ホラミン注5mg…1管 所要時間:0時間30分 本体1本目 1回	点滴(D.I.V.)…1 末梢メイン 大塚生食注 100mL…1瓶 テカドロン注射液6.6mg…1瓶 ホラミン注5mg…1管 所要時間:0時間30分 本体1本目 1回	
	点滴(D.I.V.)…1 末梢メイン 大塚生食注 50mL…1瓶 所要時間:0時間15分 フラッシュ用 アービタックス投与前 本体2本目 1回	点滴(D.I.V.)…1 末梢メイン 大塚生食注 50mL…1瓶 所要時間:0時間15分 フラッシュ用 アービタックス投与前 本体2本目 1回	
	点滴(D.I.V.)…1 末梢メイン アービタックス注【規格分解用】 …0.1mg 大塚生食注 250mL…1袋 所要時間:1時間0分 本体3本目 1回	点滴(D.I.V.)…1 末梢メイン アービタックス注【規格分解用】 …0.1mg 大塚生食注 250mL…1袋 所要時間:1時間0分 本体3本目 1回	
	点滴(D.I.V.)…1 末梢メイン 大塚生食注 50mL…1瓶 所要時間:0時間15分 フラッシュ用 アービタックス投与後 本体4本目 1回	点滴(D.I.V.)…1 末梢メイン 大塚生食注 50mL…1瓶 所要時間:0時間15分 フラッシュ用 アービタックス投与後 本体4本目 1回	
	点滴(D.I.V.)…1 末梢メイン エルフラット注【規格分解用】 …0.1mg テルモ糖注5% 250mL…1袋 所要時間:2時間0分 レボネリナートと同時に投与 本体5本目 1回		
	点滴(D.I.V.)…1 末梢側管 レボネリナート注【規格分解用】…0.1mg テルモ糖注5% 250mL…1袋 所要時間:2時間0分 エルフラットと同時に投与 本体6本目 1回		
	点滴(D.I.V.)…1 末梢メイン 5-FU注【規格分解用】…0.1mg 大塚生食注 50mL…1瓶 所要時間:0時間15分 全開で投与 本体7本目 1回		
	点滴(D.I.V.)…1 末梢メイン 5-FU注【規格分解用】…0.1mg 生理食塩液【規格分解用】…0.1mL 所要時間:46時間0分 ポートより投与 インフューザーポンプを用いて 46時間かけて持続投与 本体8本目 1回		
看護			
看護項目			
検査			