

★膵臓癌 GEM+nabPTX療法

	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
				休業日	最終日
注射	点滴(D.I.V.) … 1 【6.6mg】デカトロン注射液 … 1瓶 グラニセロン点滴静注バッグ3mg … 1袋 所要時間:0時間30分 本体1本目 1回	点滴(D.I.V.) … 1 【6.6mg】デカトロン注射液 … 1瓶 グラニセロン点滴静注バッグ3mg … 1袋 所要時間:0時間30分 本体1本目 1回	点滴(D.I.V.) … 1 【6.6mg】デカトロン注射液 … 1瓶 グラニセロン点滴静注バッグ3mg … 1袋 所要時間:0時間30分 本体1本目 1回		
	点滴(D.I.V.) … 1 アブラキサン注【規格分解用】 … 0.1mg 大塚生食注 100mL … 1瓶 所要時間:0時間30分 1V当り20mLで溶解して下さい。残った生食をすべて抜いてから懸濁したアブラキサン注を必要量入れて下さい。 本体2本目 1回	点滴(D.I.V.) … 1 アブラキサン注【規格分解用】 … 0.1mg 大塚生食注 100mL … 1瓶 所要時間:0時間30分 1V当り20mLで溶解して下さい。残った生食をすべて抜いてから懸濁したアブラキサン注を必要量入れて下さい。 本体2本目 1回	点滴(D.I.V.) … 1 アブラキサン注【規格分解用】 … 0.1mg 大塚生食注 100mL … 1瓶 所要時間:0時間30分 1V当り20mLで溶解して下さい。残った生食をすべて抜いてから懸濁したアブラキサン注を必要量入れて下さい。 本体2本目 1回		
	点滴(D.I.V.) … 1 ★大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 フラッシュ用 本体3本目 1回	点滴(D.I.V.) … 1 ★大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 フラッシュ用 本体3本目 1回	点滴(D.I.V.) … 1 ★大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 フラッシュ用 本体3本目 1回		
	点滴(D.I.V.) … 1 ゲムシタピン注[GEM]【規格分解用 … 0.1mg 大塚生食注2ポート100mL … 1キット 所要時間:0時間30分 200mg当り5mLで溶解して下さい。 本体4本目 1回	点滴(D.I.V.) … 1 ゲムシタピン注[GEM]【規格分解用 … 0.1mg 大塚生食注2ポート100mL … 1キット 所要時間:0時間30分 200mg当り5mLで溶解して下さい。 本体4本目 1回	点滴(D.I.V.) … 1 ゲムシタピン注[GEM]【規格分解用 … 0.1mg 大塚生食注2ポート100mL … 1キット 所要時間:0時間30分 200mg当り5mLで溶解して下さい。 本体4本目 1回		
	点滴(D.I.V.) … 1 ★大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 フラッシュ用 本体5本目 1回	点滴(D.I.V.) … 1 ★大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 フラッシュ用 本体5本目 1回	点滴(D.I.V.) … 1 ★大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 フラッシュ用 本体5本目 1回		
投薬					
検査					