

★Hyper-CVAD(B)療法

	Day1	Day2	Day3	Day4
注射	点滴(D.I.V.) … 1 テルモ生食 500mL … 1袋 メトレキセート注[MTX]【規格分解用 … 0.1mg 所要時間:24時間0分 1回		点滴(D.I.V.) … 1 生理食塩液【規格分解用】 … 0.1mL キロサイト注【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:3時間0分 1回目 1回	点滴(D.I.V.) … 1 生理食塩液【規格分解用】 … 0.1mL キロサイト注【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:3時間0分 1回目 1回
	点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 100mL … 1瓶 ソル・マトロール静注用125mg … 0.4瓶 所要時間:0時間30分 ソルマルコートは添付の溶解液2mLで溶解後、 0.8mL使用して下さい。 1回目 1回		点滴(D.I.V.) … 1 生理食塩液【規格分解用】 … 0.1mL キロサイト注【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:3時間0分 2回目 1回	点滴(D.I.V.) … 1 生理食塩液【規格分解用】 … 0.1mL キロサイト注【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:3時間0分 2回目 1回
	点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 100mL … 1瓶 ソル・マトロール静注用125mg … 0.4瓶 所要時間:0時間30分 ソルマルコートは添付の溶解液2mLで溶解後、 0.8mL使用して下さい。 2回目 1回		点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 100mL … 1瓶 ソル・マトロール静注用125mg … 0.4瓶 所要時間:0時間30分 キロサイト投与前に施行して下さい。 ソルマルコートは添付の溶解液2mLで溶解後、 0.8mL使用して下さい。 1回目 1回	点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 100mL … 1瓶 ソル・マトロール静注用125mg … 0.4瓶 所要時間:0時間30分 キロサイト投与前に施行して下さい。 ソルマルコートは添付の溶解液2mLで溶解後、 0.8mL使用して下さい。 1回目 1回
			点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 100mL … 1瓶 ソル・マトロール静注用125mg … 0.4瓶 所要時間:0時間30分 キロサイト投与前に施行して下さい。 ソルマルコートは添付の溶解液2mLで溶解後、 0.8mL使用して下さい。 2回目 1回	点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 100mL … 1瓶 ソル・マトロール静注用125mg … 0.4瓶 所要時間:0時間30分 キロサイト投与前に施行して下さい。 ソルマルコートは添付の溶解液2mLで溶解後、 0.8mL使用して下さい。 2回目 1回
検査				