

★APL JALSG97 寛解導入B IDA+Ara-C療法

	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5
注射	点滴(D.I.V.) … 1 イタマイン注[IDR]【規格分解用】 … 0.01mg 大塚生食注2ホ ² -ト100mL … 1キット 所要時間:0時間30分 1V当り5mlで溶解して下さい。 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 キロサト注[Ara-C]【規格分解用 … 0.01mg テルモ生食 500mL … 1袋 所要時間:24時間0分 1回	点滴(D.I.V.) … 1 イタマイン注[IDR]【規格分解用】 … 0.01mg 大塚生食注2ホ ² -ト100mL … 1キット 所要時間:0時間30分 1V当り5mlで溶解して下さい。 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 キロサト注[Ara-C]【規格分解用 … 0.01mg テルモ生食 500mL … 1袋 所要時間:24時間0分 1回	点滴(D.I.V.) … 1 キロサト注[Ara-C]【規格分解用 … 0.01mg テルモ生食 500mL … 1袋 所要時間:24時間0分 1回	点滴(D.I.V.) … 1 キロサト注[Ara-C]【規格分解用 … 0.01mg テルモ生食 500mL … 1袋 所要時間:24時間0分 1回	点滴(D.I.V.) … 1 キロサト注[Ara-C]【規格分解用 … 0.01mg テルモ生食 500mL … 1袋 所要時間:24時間0分 1回
投薬					
臨床検査					
看護					
看護項目					
検査					