

★ATLL VEPA療法(外来用)

	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day36
注射	<p>点滴(D.I.V.) … 1 グラネセロン静注液3mgハック「NK」… 1袋 水溶性プレドニン【規格分解】 … 0.1mg 所要時間:0時間30分 1回</p> <p>静脈内注射(I.V.) … 1 生理食塩液【規格分解用】 … 0.1mL オンコピン注[VCR]【規格分解用】 … 0.1mg 1V当り10mlで溶解して下さい。 1回</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 テルモ生食 500mL … 1袋 エドキシサン注[CPA]【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:2時間0分 1V当り25mlで溶解して下さい。 1回</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注2ホート100mL … 1キット ドキシルビシン注[DXR]【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:0時間30分 10mg当り3mlで溶解して下さい。 1回</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 テルモ生食 500mL … 1袋 エドキシサン注[CPA]【規格分解用】 … 0.1mg グラネセロン静注液1mgシリンジ「サワイ」… 1筒 所要時間:2時間0分 1V当り25mlで溶解して下さい。 1回</p> <p>静脈内注射(I.V.) … 1 大塚生食注 20mL … 1管 フラッシュ用 1回</p>	<p>静脈内注射(I.V.) … 1 生理食塩液【規格分解用】 … 0.1mL オンコピン注[VCR]【規格分解用】 … 0.1mg 1V当り10mlで溶解して下さい。 1回</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 テルモ生食 500mL … 1袋 エドキシサン注[CPA]【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:2時間0分 1V当り25mlで溶解して下さい。 1回</p> <p>静脈内注射(I.V.) … 1 大塚生食注 20mL … 1管 フラッシュ用 1回</p>	<p>静脈内注射(I.V.) … 1 生理食塩液【規格分解用】 … 0.1mL オンコピン注[VCR]【規格分解用】 … 0.1mg 1V当り10mlで溶解して下さい。 1回</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 テルモ生食 500mL … 1袋 エドキシサン注[CPA]【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:2時間0分 1V当り25mlで溶解して下さい。 1回</p> <p>静脈内注射(I.V.) … 1 大塚生食注 20mL … 1管 フラッシュ用 1回</p>	<p>点滴(D.I.V.) … 1 グラネセロン静注液3mgハック「NK」… 1袋 水溶性プレドニン【規格分解】 … 0.1mg 所要時間:0時間30分 1回</p> <p>静脈内注射(I.V.) … 1 生理食塩液【規格分解用】 … 0.1mL オンコピン注[VCR]【規格分解用】 … 0.1mg 1V当り10mlで溶解して下さい。 1回</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 テルモ生食 500mL … 1袋 エドキシサン注[CPA]【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:2時間0分 1V当り25mlで溶解して下さい。 1回</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注2ホート100mL … 1キット ドキシルビシン注[DXR]【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:0時間30分 10mg当り3mlで溶解して下さい。 1回</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 テルモ生食 500mL … 1袋 エドキシサン注[CPA]【規格分解用】 … 0.1mg グラネセロン静注液1mgシリンジ「サワイ」… 1筒 所要時間:2時間0分 1V当り25mlで溶解して下さい。 1回</p> <p>静脈内注射(I.V.) … 1 大塚生食注 20mL … 1管 フラッシュ用 1回</p>	<p>静脈内注射(I.V.) … 1 生理食塩液【規格分解用】 … 0.1mL オンコピン注[VCR]【規格分解用】 … 0.1mg 1V当り10mlで溶解して下さい。 1回</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 テルモ生食 500mL … 1袋 エドキシサン注[CPA]【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:2時間0分 1V当り25mlで溶解して下さい。 1回</p> <p>静脈内注射(I.V.) … 1 大塚生食注 20mL … 1管 フラッシュ用 1回</p>	<p>静脈内注射(I.V.) … 1 生理食塩液【規格分解用】 … 0.1mL オンコピン注[VCR]【規格分解用】 … 0.1mg 1V当り10mlで溶解して下さい。 1回</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 テルモ生食 500mL … 1袋 エドキシサン注[CPA]【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:2時間0分 1V当り25mlで溶解して下さい。 1回</p> <p>静脈内注射(I.V.) … 1 大塚生食注 20mL … 1管 フラッシュ用 1回</p>
検査						