

★MDS Vidaza(5-2-2)療法

	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day9
注射	皮下注射(S.C.)…1 ビダザ注【規格分解用】…0.1mg 大塚蒸留水【規格分解用】…0.1mL 1V当り4mlで溶解して下さい。 1回	皮下注射(S.C.)…1 ビダザ注【規格分解用】…0.1mg 大塚蒸留水【規格分解用】…0.1mL 1V当り4mlで溶解して下さい。 1回	皮下注射(S.C.)…1 ビダザ注【規格分解用】…0.1mg 大塚蒸留水【規格分解用】…0.1mL 1V当り4mlで溶解して下さい。 1回	皮下注射(S.C.)…1 ビダザ注【規格分解用】…0.1mg 大塚蒸留水【規格分解用】…0.1mL 1V当り4mlで溶解して下さい。 1回	皮下注射(S.C.)…1 ビダザ注【規格分解用】…0.1mg 大塚蒸留水【規格分解用】…0.1mL 1V当り4mlで溶解して下さい。 1回	皮下注射(S.C.)…1 ビダザ注【規格分解用】…0.1mg 大塚蒸留水【規格分解用】…0.1mL 1V当り4mlで溶解して下さい。 1回	皮下注射(S.C.)…1 ビダザ注【規格分解用】…0.1mg 大塚蒸留水【規格分解用】…0.1mL 1V当り4mlで溶解して下さい。 1回
検査							