

★MDS Vidaza(連続5日投与)療法【DIV】

	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5
注射	点滴(D.I.V.) … 1 ビターザ注【規格分解用】★ … 0.1mg 大塚蒸留水【規格分解用】 … 0.1mL 大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 1V当り蒸留水10mlで溶解して下さい。 調整から1時間以内に投与を終了して下さい。 1回	点滴(D.I.V.) … 1 ビターザ注【規格分解用】★ … 0.1mg 大塚蒸留水【規格分解用】 … 0.1mL 大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 1V当り蒸留水10mlで溶解して下さい。 調整から1時間以内に投与を終了して下さい。 1回	点滴(D.I.V.) … 1 ビターザ注【規格分解用】★ … 0.1mg 大塚蒸留水【規格分解用】 … 0.1mL 大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 1V当り蒸留水10mlで溶解して下さい。 調整から1時間以内に投与を終了して下さい。 1回	点滴(D.I.V.) … 1 ビターザ注【規格分解用】★ … 0.1mg 大塚蒸留水【規格分解用】 … 0.1mL 大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 1V当り蒸留水10mlで溶解して下さい。 調整から1時間以内に投与を終了して下さい。 1回	点滴(D.I.V.) … 1 ビターザ注【規格分解用】★ … 0.1mg 大塚蒸留水【規格分解用】 … 0.1mL 大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 1V当り蒸留水10mlで溶解して下さい。 調整から1時間以内に投与を終了して下さい。 1回
検査					