

★多発性骨髄腫 ERd療法【1～2クール目】

	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28 最終日
注射	<p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ★大塚生食注 50mL … 1瓶 1回</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 【6.6mg】デカロン注射液 … 1瓶 大塚生食注 100mL … 1瓶 所要時間:1時間0分 1回</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 エムプリシテイ点滴静注【規格分解用】 … 0.1mg 大塚生食注 250mL … 1袋 大塚蒸留水【規格分解用】 … 0.1mL ★生食250mLから20mLを抜いてから希釈 して下さい 注射用水(300mg/Vは13mL、400mg/Vは 17mL)で溶解して下さい 0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用 初回投与時30mL/hrで30分投与。問題な ければ60mL/hrにあげて30分投与。投与 開始60分以降は120mL/hrでOK。それ以上 超えないこと。2クール目は120mL/hr開始 でOK。 1回</p>	<p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ★大塚生食注 50mL … 1瓶 1回</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 【6.6mg】デカロン注射液 … 1瓶 大塚生食注 100mL … 1瓶 所要時間:1時間0分 1回</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 エムプリシテイ点滴静注【規格分解用】 … 0.1mg 大塚生食注 250mL … 1袋 大塚蒸留水【規格分解用】 … 0.1mL ★生食250mLから20mLを抜いてから希釈 して下さい 注射用水(300mg/Vは13mL、400mg/Vは 17mL)で溶解して下さい 0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用 投与開始30分は60mL/hrで投与。問題な ければ120mL/hrにあげてOK。それ以上 超えないこと。2クール目は120mL/hr開始 でOK。 1回</p>	<p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ★大塚生食注 50mL … 1瓶 1回</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 【6.6mg】デカロン注射液 … 1瓶 大塚生食注 100mL … 1瓶 所要時間:1時間0分 1回</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 エムプリシテイ点滴静注【規格分解用】 … 0.1mg 大塚生食注 250mL … 1袋 大塚蒸留水【規格分解用】 … 0.1mL ★生食250mLから20mLを抜いてから希釈 して下さい 注射用水(300mg/Vは13mL、400mg/Vは 17mL)で溶解して下さい 0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用 投与開始30分は60mL/hrで投与。問題な ければ120mL/hrにあげてOK。それ以上 超えないこと。2クール目は120mL/hr開始 でOK。 1回</p>	<p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ★大塚生食注 50mL … 1瓶 1回</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 【6.6mg】デカロン注射液 … 1瓶 大塚生食注 100mL … 1瓶 所要時間:1時間0分 1回</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 エムプリシテイ点滴静注【規格分解用】 … 0.1mg 大塚生食注 250mL … 1袋 大塚蒸留水【規格分解用】 … 0.1mL ★生食250mLから20mLを抜いてから希釈 して下さい 注射用水(300mg/Vは13mL、400mg/Vは 17mL)で溶解して下さい 0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用 投与開始30分は60mL/hrで投与。問題な ければ120mL/hrにあげてOK。それ以上 超えないこと。2クール目は120mL/hr開始 でOK。 1回</p>	
投薬					
検査					