

★多発性骨髄腫 ERd療法【3クール目以降】

	Day1	Day15	Day28
			最終日
注射	<p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ★大塚生食注 50mL … 1瓶 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 【6.6mg】テカ[®]ロン注射液 … 1瓶 大塚生食注 100mL … 1瓶 所要時間:1時間0分 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 エムプリシテイ点滴静注【規格分解用】 … 0.1mg 大塚生食注 250mL … 1袋 大塚蒸留水【規格分解用】 … 0.1mL ★生食250mLから20mLを抜いてから希釈 して下さい 注射用水(300mg/Vは13mL、400mg/Vは 17mL)で溶解して下さい 0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用 投与速度は120mL/hrを超えないこと 1回</p>	<p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ★大塚生食注 50mL … 1瓶 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 【6.6mg】テカ[®]ロン注射液 … 1瓶 大塚生食注 100mL … 1瓶 所要時間:1時間0分 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 エムプリシテイ点滴静注【規格分解用】 … 0.1mg 大塚生食注 250mL … 1袋 大塚蒸留水【規格分解用】 … 0.1mL ★生食250mLから20mLを抜いてから希釈 して下さい 注射用水(300mg/Vは13mL、400mg/Vは 17mL)で溶解して下さい 0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用 投与速度は120mL/hrを超えないこと 1回</p>	
投薬			
検査			