◆多発性骨髄腫　VAD療法

													休薬最終日
	Day1	Day2	Day3	Day4	Day9	Day10	Day11	Day12	Day17	Day18	Day19	Day20	Day28
注射	点滴(DIV.) … 1 ｵﾝｺﾋﾞﾝ注射用 … 0.4mg ﾃﾙﾓ生食　500mL … 1袋 ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ注DXR【規格分解用】… 0.01mg 所要時間：24時間0分 ｵﾝｺﾋﾞﾝはV当り10mlで溶解後、4ml使用して下さい。 ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ10mg当り3mlで溶解して下さい。 1回 --- 点滴(DIV.) … 1 ﾃﾞｶﾄﾛﾝ注射液6.6mg … 5瓶 大塚生食注　100mL … 1瓶 所要時間：0時間30分 1回	点滴(DIV.) … 1 ｵﾝｺﾋﾞﾝ注射用 … 0.4mg ﾃﾙﾓ生食　500mL … 1袋 ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ注DXR【規格分解用】… 0.01mg 所要時間：24時間0分 ｵﾝｺﾋﾞﾝはV当り10mlで溶解後、4ml使用して下さい。 ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ10mg当り3mlで溶解して下さい。 1回 --- 点滴(DIV.) … 1 ﾃﾞｶﾄﾛﾝ注射液6.6mg … 5瓶 大塚生食注　100mL … 1瓶 所要時間：0時間30分 1回	点滴(DIV.) … 1 ｵﾝｺﾋﾞﾝ注射用 … 0.4mg ﾃﾙﾓ生食　500mL … 1袋 ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ注DXR【規格分解用】… 0.01mg 所要時間：24時間0分 ｵﾝｺﾋﾞﾝはV当り10mlで溶解後、4ml使用して下さい。 ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ10mg当り3mlで溶解して下さい。 1回 --- 点滴(DIV.) … 1 ﾃﾞｶﾄﾛﾝ注射液6.6mg … 5瓶 大塚生食注　100mL … 1瓶 所要時間：0時間30分 1回	点滴(DIV.) … 1 ｵﾝｺﾋﾞﾝ注射用 … 0.4mg ﾃﾙﾓ生食　500mL … 1袋 ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ注DXR【規格分解用】… 0.01mg 所要時間：24時間0分 ｵﾝｺﾋﾞﾝはV当り10mlで溶解後、4ml使用して下さい。 ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ10mg当り3mlで溶解して下さい。 1回 --- 点滴(DIV.) … 1 ﾃﾞｶﾄﾛﾝ注射液6.6mg … 5瓶 大塚生食注　100mL … 1瓶 所要時間：0時間30分 1回	点滴(DIV.) … 1 大塚生食注　100mL … 1瓶 ﾃﾞｶﾄﾛﾝ注射液6.6mg … 5瓶 所要時間：0時間30分 1回	点滴(DIV.) … 1 大塚生食注　100mL … 1瓶 ﾃﾞｶﾄﾛﾝ注射液6.6mg … 5瓶 所要時間：0時間30分 1回	点滴(DIV.) … 1 大塚生食注　100mL … 1瓶 ﾃﾞｶﾄﾛﾝ注射液6.6mg … 5瓶 所要時間：0時間30分 1回	点滴(DIV.) … 1 大塚生食注　100mL … 1瓶 ﾃﾞｶﾄﾛﾝ注射液6.6mg … 5瓶 所要時間：0時間30分 1回	点滴(DIV.) … 1 大塚生食注　100mL … 1瓶 ﾃﾞｶﾄﾛﾝ注射液6.6mg … 5瓶 所要時間：0時間30分 1回	点滴(DIV.) … 1 大塚生食注　100mL … 1瓶 ﾃﾞｶﾄﾛﾝ注射液6.6mg … 5瓶 所要時間：0時間30分 1回	点滴(DIV.) … 1 大塚生食注　100mL … 1瓶 ﾃﾞｶﾄﾛﾝ注射液6.6mg … 5瓶 所要時間：0時間30分 1回	点滴(DIV.) … 1 大塚生食注　100mL … 1瓶 ﾃﾞｶﾄﾛﾝ注射液6.6mg … 5瓶 所要時間：0時間30分 1回	
看護													
看護項目													
検査													